

Bronchoscopie

Kijken in de luchtwegen

INLEIDING

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een bronchoscopie nodig is om de aard van uw klachten te kunnen vaststellen. Bronchoscopie betekent kijken in de luchtwegen. Dit gebeurt met een bronchoscoop.

DOEL VAN HET ONDERZOEK

De bronchoscoop is een dunne flexibele slang. De longarts die het onderzoek uitvoert kan hiermee direct in de grote luchtwegvertakkingen kijken om eventuele afwijkingen op het spoor te komen. Bovendien kan de longarts tijdens het onderzoek ook longslim of spoelvocht afzuigen. Ook kunnen er kleine "hapjes" longweefsel worden afgenomen. Longslim, spoelvocht en/of longweefsel worden in het laboratorium onderzocht. Bronchoscopie is in het algemeen niet pijnlijk.

VOORBEREIDING

U kunt zich melden bij de balie van 9C. Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 00.00 uur niets meer mag eten of drinken. Indien u medicijnen gebruikt kunt u deze met een klein slokje water innemen. Indien u Sintrom of Marcoumar gebruikt dient u met uw longarts te overleggen om dit tijdelijk te onderbreken. Wilt u zelf contact opnemen met ATAL om te melden dat u tijdelijk bent gestopt met uw medicijnen. De dag van het onderzoek, na de ingreep, kunt u ATAL bellen voor de startdosis en een nieuwe controle afspraak. Indien u meerdere medicijnen gebruikt vragen wij u om deze mee te nemen.

HET ONDERZOEK

Voor het onderzoek begint, verdooft de longarts eerst uw mond- en keelholte met een spray en druppelt daarna een vloeistof in uw luchtwegen om deze plaatselijk te verdoven. Als de verdoving is ingewerkt vraagt de verpleegkundige u op een onderzoekstafel te gaan liggen. De longarts schuift de bronchoscoop voorzichtig in uw keel. Uw luchtwegen worden niet afgesloten, zodat u rustig door kunt ademen.

De arts en de verpleegkundige vertellen u precies wat er gaat gebeuren. De duur van het onderzoek varieert per patiënt, maar duurt meestal niet langer dan 20 minuten.

NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek gaat u enkele uren voor observatie naar de afdeling Dagbehandeling op 9C of naar de verpleegafdeling waar u bent opgenomen.

- Omdat uw keel verdoofd is, mag u na het onderzoek niet meteen eten en/of drinken. Door de verdoving zou u zich kunnen verslikken. Van de arts of de verpleegkundige hoort u wanneer u weer mag eten of drinken. Meestal is dat na ongeveer anderhalf uur.
- Het kan zijn dat u een geïrriteerd gevoel in de keel hebt en wat moeilijk slikt. Dit gaat gewoonlijk vanzelf over.
- Het kan voorkomen dat u wat bloederig slijm ophoest, ook de dag na de ingreep. Dit gaat vanzelf over.
- Soms heeft u na het onderzoek een benauwd gevoel. Zonodig krijgt u een medicijn hiertegen.
- De verpleegkundige zegt u wanneer u naar huis kunt.
- De uitslag van het onderzoek verneemt u van uw behandelend arts bij uw eerst volgende afspraak.

VRAGEN?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om deze te stellen. Uw behandelend arts en de verpleegkundige zijn ten allen tijde bereid om uw vragen te beantwoorden.

VERHINDERING

Indien u onverwachts verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk omdat zo spoedig mogelijk door te geven.

TELEFOONNUMMERS

Tijdens kantooruren:

Polikliniek longziekten: 020 512 5113

Dagbehandeling, Niet-snijdende specialismen:
Tel: 020 – 512 4152

Buiten kantooruren:

De dienstdoende arts-assistent via de
Spoed Eisende Hulp, tel: 020 – 512 4113