

Open tuberculose

OPEN TUBERCULOSE

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u open tuberculose hebt. Tuberculose is een infectie in uw longen die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. Open tuberculose wil zeggen dat u anderen kunt besmetten. Om dat te voorkomen wordt u in een aparte kamer verpleegd.

ISOLATIEVERPLEGING

Zolang uw tuberculose besmettelijk is komen er, wanneer u hoest of niest, tuberkelbacteriën in de lucht. Iedereen die bij u in de buurt is kan deze ziekmakende bacteriën inademen en zelf ziek worden.

Om dat te voorkomen gelden onderstaande voorzorgsmaatregelen tot er geen besmettingsgevaar meer is.

- U wordt in een aparte kamer verpleegd. De deur van deze kamer moet gesloten blijven.
- Iedereen die binnenkomt draagt een mond/neusmasker.

U kunt de kans op besmetting verminderen wanneer u bij het hoesten of niezen steeds een (papieren) zakdoek voor uw mond en neus houdt.

BEHANDELING

De infectie in uw longen wordt behandeld met een combinatie van medicijnen.

Dat is een kuur van minstens zes maanden; soms langer, afhankelijk van de gevoeligheid van de bacterie.

Die kuur moet u af maken. Zolang hoeft u echter niet in isolatie te blijven.

Zodra er door laboratoriumonderzoek geen tuberkelbacteriën meer in uw longslijm worden aangetoond, vormt u geen besmettingsgevaar meer voor anderen.

U hoeft dan ook niet langer geïsoleerd te worden. Meestal is dat drie weken na het begin van de kuur. De infectie zelf is pas na zes maanden helemaal verdwenen; soms duurt het langer.

VRAGEN?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, blijf daar dan niet mee zitten. Uw behandelend arts en de verpleegkundigen zijn gaarne bereid om uw vragen te beantwoorden.