

Praktische adviezen voor thuis

Na de besnijdenis

PRAKTISCHE ADVIEZEN VOOR THUIS

Uw zoon is vandaag besneden en mag weer met u mee naar huis. In deze folder geven wij u praktische adviezen voor thuis.

ËTEN EN DRINKEN

Eenmaal thuis mag uw zoon weer alles eten en drinken. Als uw zoon misselijk blijft en braakt, geef dan alleen kleine slokjes water tot het beter gaat.

PIJNMEDICATIE

Na de operatie is de eikel onbedekt. Dit kan gedurende de eerste weken gevoelig zijn. Tegen de pijn geeft u uw kind de voorgeschreven paracetamol zetpillen. Deze kunt u kopen bij de drogist of de apotheek. Wij adviseren om vandaag en morgen in ieder geval om de 6 uur een paracetamol zetpil te geven. Daarna geeft u alleen een zetpil als u denkt dat het nodig is. Geef niet meer dan 4 zetpillen per 24 uur.

WONDVERZORGING

De eikel is de eerste tijd rood en gezwollen en is daardoor gevoelig. Om te voorkomen dat de penis aan de luier of onderbroek gaat plakken adviseren wij om de voorgeschreven Flammazinezalf op de eikel te doen. Dit verzacht de pijn en werkt bovendien ontsmettend. U hebt een recept voor de zalf gekregen op de polikliniek. Uw zoon mag gewoon in bad of onder de douche. Hij zal baden zelfs prettig vinden omdat dat de pijn verlicht. Bovendien helpt regelmatig baden infecties te voorkomen. Na het baden dept u de penis voorzichtig droog. Daarna doet u de Flammazinezalf op de eikel. De zalf kan vlekken achterlaten op het ondergoed en geeft een grijzige kleur aan de huid.

REACTIE OP DE ZIEKENHUISOPNAME

Sommige kinderen zijn na een opname in het ziekenhuis uit hun doen. Elk kind uit dat op zijn eigen manier. Reacties die zich voor kunnen doen zijn: slecht kunnen slapen, bang zijn om naar bed te gaan, angstig dromen, driftig zijn, paniecreacties, niet willen eten, bedplassen of terugval in zindelijkheid. Met wat extra aandacht gaat dat meestal vanzelf weer over.

WEER NAAR SCHOOL

Als uw zoon zich goed voelt, mag hij de volgende dag weer gewoon naar school, de crèche of de peuterzaal.

SPORTEN EN ZWEMMEN

De eerste week mag uw kind niet sporten of zwemmen.

MOGELIJKE COMPLICATIES

Complicaties na een besnijdenis komen zelden voor. Het kan echter voorkomen dat de wond blijft bloeden, de wondgenezing niet voorspoedig gaat of uw kind koorts krijgt.

WIE KUNT U BELLEN?

Als een van de bovenstaande problemen zich binnen 24 uur voordoen kunt u bellen met de afdeling Spoedeisende Hulp 020 512 4113. Vanaf 24 uur na ontslag neemt u contact op met uw eigen huisarts.

CONTROLE AFSPRAAK

Over ongeveer een week komt u met uw zoon voor controle bij de chirurg op de polikliniek. U krijgt van ons een afspraak mee.