

# De behandeling van spataderen met thermocoagulatie

## SPATADEREN

De (vaat)chirurg of physician assistant heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor behandeling van spataderen (varices). Deze brochure geeft u een globaal overzicht van de behandeling die bij u gaat plaatsvinden.

## NADER ONDERZOEK

Afhankelijk van de bevindingen van de arts kan nader onderzoek gewenst zijn.

Doorgaans is dat een Doppler of Duplex (echo)onderzoek.

Dat is een onderzoek met ultrageluidsgolven, waarbij een indruk kan worden verkregen over de doorgankelijkheid van de bloedvaten, de stroomrichting van het bloed en de functie van de kleppen. Het onderzoek is volstrekt pijnloos, onschadelijk (geen stralen) en wordt poliklinisch uitgevoerd.

## DIVERSE

### BEHANDELMOGELIJKHEDEN

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de eventuele bevindingen bij Doppler of Duplex onderzoek, zijn er verschillende behandelmogelijkheden:

- ❑ Een operatieve behandeling op de operatiekamer. Hierbij worden de spataderen onder algehele narcose of verdoving met een ruggenprik verwijderd.
- ❑ Een operatieve behandeling met lasertherapie. Hierbij wordt met behulp van laser de oppervlakkige lange beenader uitgeschakeld.
- ❑ Een operatieve behandeling op de behandelafdeling. Hierbij worden kleine kluwen van vaatjes onder plaatselijke verdoving verwijderd (convolutectomie).
- ❑ Een poliklinische behandeling. Hierbij worden de spataderen weggespoten (sclerotherapie).
- ❑ Een poliklinische behandeling. Hierbij worden de kleinste spatadertjes weggehaald met thermocoagulatie.
- ❑ Crossectomie van de korte beenader.

N.B. U kunt de verwijderde aderen missen, omdat het bloed langs een andere weg kan stromen en de spatader toch niet meer goed functioneerde.

Het is zo dat spataderen op een andere plek kunnen terugkomen. Ook kan er een enkele keer een waas van dunne spatadertjes ontstaan. De aard van de spataders is zodanig dat er in een aantal gevallen, ook op lange termijn, onderhoudsbehandelingen nodig zijn.

**Hieronder treft u informatie aan over de behandeling die bij u gaat plaatsvinden. In verband met een goede voorbereiding verzoeken wij u om deze informatie goed door te lezen.**

## DE POLIKLINISCHE BEHANDELING (Thermocoagulatie))

### De voorbereiding

U mag, op de ochtend voor de behandeling, de benen niet met lotion of crème insmeren. Verder is er geen voorbereiding nodig.

### De behandeling

De behandeling is uitsluitend geschikt voor de kleinste spataderen. De kleine spatader wordt met een hele kleine naald om de 2 mm aangeprikt. Zodra deze naald zich in de ader bevindt wordt er een "warmtepuls" gegeven, waardoor het bloed in de ader stolt.

Als de behandeling geslaagd is verdwijnt het adertje vanzelf.

### De nabehandeling

Na de behandeling krijgt u een verkoelende gel op het behandelde gebied gesmeerd. U mag direct weer lopen, sporten en werken.

## MOGELIJKE COMPLICATIES

Het kan gebeuren dat de behandeling niet meteen werkt en dat u nog een aantal keren terug moet komen.

## VRAGEN

Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebt, stelt u die dan bij uw eerstvolgende bezoek aan de chirurg.

Voor dringende vragen kunt u bellen naar de polikliniek chirurgie tussen 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur.

Telefoonnummer 020 - 512 5103.

U kunt ook mailen naar: [spataderen@slz.nl](mailto:spataderen@slz.nl)

Voor meer informatie: [www.hartenvaatgroep.nl](http://www.hartenvaatgroep.nl)