

Een pleurapunctie

ALGEMEEN

De longarts heeft met u besproken om een pleurapunctie bij u te doen. In deze folder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt.

WAAROM EEN PLEURAPUNCTIE?

Met een pleurapunctie kan de longarts nagaan of er vocht tussen de longvliezen (pleurabladen) aanwezig is. Middels laboratoriumonderzoeken wordt vastgesteld van welke aard dit vocht is. Een pleurapunctie kan ook een ontlastende functie hebben. Dit gebeurt als er sprake is van vochtophoping tussen de longvliezen waardoor benauwdheid kan ontstaan. Tijdens een pleurapunctie kan de longarts ook medicijnen tussen de longvliezen inbrengen.

DE VOORBEREIDING

Op de afgesproken datum en tijdstip wordt u verwacht op de afdeling dagbehandeling 9C. Voor een pleurapunctie hoeft u niet nuchter te zijn. Als u bloedverdunnende middelen zoals Sintrommitis, Marcoumar of Ascal gebruikt, meldt u dit dan vooraf aan uw arts.

HET ONDERZOEK

De longarts verdooft de huid en het longvlies plaatselijk met een injectie. Dit is gevoelig maar het verdere onderzoek is daardoor pijnloos. Er kan wel een hoestprikkel ontstaan. De arts brengt daarna een dun slangetje (pleurakatheter) via een naald in de holte tussen de longbladen door tussen twee ribben door te prikken. Soms hoeft niet verdoofd te worden als via een prik met een lege injectiespuit alleen wat pleuravocht voor onderzoek wordt afgezogen. De ingreep duurt ongeveer 5 -10 minuten. Dit kan langer duren als er veel vocht verwijderd moet worden.

NA HET ONDERZOEK

Soms worden nog een röntgenfoto gemaakt om het effect van de pleurapunctie goed te kunnen beoordelen. Na het onderzoek gaat u terug naar de afdeling 9C, alwaar u 1 tot 2 uur ter observatie verblijft.

RISICO'S EN COMPLICATIES

Complicaties na een pleurapunctie komen niet vaak voor. Mogelijke complicaties zijn:

- Een verlaging van de bloeddruk en een langzame hartslag. Het onderzoek wordt dan onderbroken en kan over het algemeen na enkele uren zonder problemen herhaald worden.
- Wanneer er een grote hoeveelheid vocht is weggehaald, kan er longoedeem (vochtophoping) op een andere plaats in de long ontstaan. Dit verdwijnt normaal gesproken binnen drie tot vier dagen.
- Tijdelijk een pijnlijke schouder.
- Een pleurapunctie kan een klaplong (pneumothorax) veroorzaken maar dit gebeurt zelden.

DE UITSLAG

Na het onderzoek kan de arts u vertellen hoeveel vocht er is weggenomen. Als er vocht voor onderzoek naar het laboratorium gaat hoort u de uitslag binnen enkele dagen van de longarts of de zaalarts.

VRAGEN

Als u nog vragen over het onderzoek hebt, stel ze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige.