

Correctie van Afstaande oorschelpen

ALGEMEEN

Na overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot een operatieve behandeling om de afstaande oorschelp te corrigeren.

In deze algemene folder kunt u daar meer over lezen en zonodig vragen stellen. U kunt via het internet adres www.kno.nl uitgebreid informatie verkrijgen.

INLEIDING

De afwijkende stand van het oor wordt veroorzaakt door een vormafwijking van het oorschelpkraakbeen.

Afstaande oorschelpen zijn voor veel mensen een reden om zich te laten opereren. Met name kinderen worden vaak om hun 'flaporen' gepest en dit kan leiden tot problemen in hun functioneren.

Het hebben van afstaande oorschelpen komt in bepaalde families voor. Erfelijke eigenschappen spelen dan ook een rol.

DE OPERATIE

Het doel van de operatie is te zorgen dat de oren beter passen bij de verhoudingen van de rest van het aangezicht.

Kleine delen van het kraakbeen kunnen worden verwijderd en de stand van het oor wordt vervolgens gecorrigeerd.

De groei van de oorschelp is voltooid vanaf het vierde of het vijfde jaar. De ingreep kan vanaf deze leeftijd worden uitgevoerd.

Het spreekt voor zich dat de KNO-arts uitvoerig met u zal spreken over de ingreep van u of uw kind.

De operatie wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Daarvoor heeft u de nodige vooronderzoeken gehad.

NA DE OPERATIE


Na de operatie bevindt zich een oorverband om het hoofd. Hechtingen zijn vaak gemaakt van zelfoplossend materiaal. Ze verdwijnen vanzelf.

Het litteken aan de achterzijde van de oorschelp geneest mooi en onopvallend.


Bij een opname op de dagbehandeling mag u de tweede helft van de middag naar huis.

U kunt zelf niet aan het verkeer deelnemen. Regel daarom vooraf vervoer naar huis.

VOOR DE OPERATIE



NA DE OPERATIE



PIJNSTILLING

In het algemeen zijn er na de operatie weinig pijnklachten.

RISICO'S

Bij iedere operatie is er een kans op een complicatie. Deze kans is gelukkig klein. Eventuele risico's dient u goed te bespreken met uw KNO-arts.

ADVIEZEN VOOR THUIS

Wij adviseren u of uw kind de eerste dagen bedrust en twee weken na de operatie overmatige inspanningen, zoals balspelen, te vermijden. Het oor mag niet nat worden, dus oppassen met douchen.

Het aanschaffen van een brede haarband om over de oren te dragen, gedurende drie weken, is aan te raden.

Uw KNO-arts geeft u advies mee wanneer u weer aan het werk mag of naar school kan gaan. Ook maakt u een afspraak wanneer u weer op controle komt.

U doet er goed aan te bellen met de polikliniek KNO, of in het weekend met de Spoed Eisende Hulp, wanneer zich de volgende verschijnselen voordoen:

- koorts
- ernstige hoofdpijn met misselijkheid en braken
- toename van oorpijn

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Tijdens kantoortijden:

polikliniek KNO 512 5111

Buiten kantoortijden:

Spoedeisende Hulp 512 4113

RECHTEN VAN EEN MINDERJARIGE

De informatie over toestemming tot behandeling door minderjarigen kunt u lezen in de folder "Beslis jij, of beslis ik?"

VRAGEN?

Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om deze te stellen. Voor iedere patiënt is de situatie verschillend. Het kan zijn dat er om bepaalde redenen wordt afgeweken van de inhoud van deze folder.