

Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek

Vorbereiding Dotterprocedure / PTCA

INLEIDING

Ter voorbereiding op uw opname voor de PTCA (dotter) ingreep nog even enkele zaken op een rijtje.

DE OCHTEND VAN DE INGREEP

Ontbijt:

Indien ingreep voor 12.00 uur:

U dient nuchter te zijn voor de ingreep. Dit houdt in dat u na 24:00 uur 's avonds niets meer mag eten en drinken. Uw medicijnen innemen met een slokje water kan wel. Indien ingreep na 12.00 uur: U een licht ontbijt gebruiken (thee met een beschuit).

MEDICIJNEN

NB. Wij vragen u al uw huidige medicijnen mee te nemen naar het ziekenhuis.

Diabetes medicijnen:

Bloedsuiker verlagende tabletten op de ochtend van de ingreep niet innemen.

Metformine (wanneer u dit medicijn gebruikt) een dag vóór het onderzoek en op de ochtend van het onderzoek **niet** innemen.

Bloedsuikerverlagende medicijnen kunt u na de ingreep weer innemen, dus niet "s ochtends.

Halve dosering Insuline op de ochtend van de ingreep spuiten.

Bloedverdunnende medicijnen:

Acenocoumarol, indien u dit medicijn gebruikt, 3 dagen van tevoren stoppen met innemen.

Fenprocoumon, indien u dit medicijn gebruikt, 7 dagen van tevoren stoppen met het innemen

Aspirine, Ascal en Plavix mag u normaal innemen.

Overige medicatie (ook voor het hart) mag u gewoon innemen met een slokje water.

Plastabletten:

Plastabletten op de dag van de ingreep niet innemen.

VOORBEREIDING

Wilt u zo vriendelijk zijn om beide liesplooien te scheren.

TIJDENS EN NA DE INGREEP

- Wij adviseren dat uw partner of familielid met u meekomt.
- Na de PTCA (dotter) ingreep blijft u nog enkele uren in het Dottercentrum. Hierna wordt u per ambulance vervoerd naar het Slotervaartziekenhuis. Hier blijft u dan nog 1 nacht om te revalideren.
- Wanneer u bent ontslagen uit het Slotervaartziekenhuis adviseren wij u om niet zelf naar huis te rijden.

U wordt opgenomen op:

Datum:

Tijd:

Afdeling: B2 - AMC

Indien u nog vragen heeft aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen,